

	Kenomix 	Kenodim Film 	Kenomint 	Kenolac 
Désinfectant	Dioxyde de Chlore	Iode	Chlorexidine	Acide lactique
> 5% de mammites cliniques par mois	++	+++ (Kenodin film)	++	+
CCS du tank élevé	+++	++	++	+
Cultures bactériologiques	Germes contagieux > environnementaux	Germes environnementaux > Contagieux	Germes contagieux et Environnementaux	Mammites d'été (<i>Arcanobacterium pyogenes</i>)
Prototheca	Efficace	Non testé	Non testé	Non testé
Serratia spp, pseudomonas	Efficace	Efficace	Non Efficace	Efficace
-Verrues (infections de la peau dues à des virus)	Efficace	Efficace	Non Efficace	Ok
-Mauvaise condition de la peau des trayons - Trayons abîmés - Hyperkératose	+	++	+++	++
Hygiène du bâtiment	- Pression d'infection élevée	- Sur-population - Si environnement très sale	- Conditions normales	Pression d'infection faible
Utilisation de chaux	Ok	Ne pas utiliser	OK	OK
Couleur	+++	++	+	+++
Hiver/conditions froides	+	+	+++	++
Été (mouches)	+	+	++	+++
Stabilité (RTU après ouverture)	26 jours	-	-	-
Elevages biologiques	Certifié Ecocert	/	/	Certifié Ecocert
Produit vétérinaire	Non	Kenostart (médicament)	Enregistrement médicament	Non
Aspect visuel				

