

CLAC

STRONG



DESCRIPTIF PRODUIT

Mélange 3 céréales à base 0,0025% Brodifacoum Numéro d'autorisation : FR-2015-0002 • Appât sur grain, prêt à l'emploi Société responsable de la mise sur le marché : Belgagri SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium.

Support	Céréales
Utilisation	Raticide
Cible	Rats/souris
Usages	Professionnel
Zones d'utilisation	Intérieur et extérieur
Référence(s)	RD-BRD-69001: 5kg RD-BRD-69002: 10kg

UTILISATION

Professionnels de la lutte contre les rongeurs

METHODE D'APPLICATION / DOSE

Le produit doit être appliqué dans des stations d'appâts sécurisées ou dans des points d'appâts couverts et protégés.

- Contre souris (*Mus musculus*) , usage intérieur uniquement : 2530g d'appât par station d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux stations doit être de 2 à 5 mètres.
- Contre rats bruns (*Rattus norvegicus*) et rats noirs (*Rattus rattus*) , usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 50 à 100 g d'appât par station d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux stations doit être de 5 à 10 mètres.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le port de gants est recommandé. Ne pas toucher les appâts directement avec les doigts. Ne pas ouvrir les sachets. Les postes doivent être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés. Contrôler les postes une fois par semaine, les compléter si nécessaire. Les symptômes apparaissent 36 h après l'ingestion et les rongeurs meurent en 4 à 10 jours. Ne pas nettoyer les postes d'appâtage entre deux applications. Ne jamais nettoyer les postes à l'eau. Adapter la dose préconisée par poste d'appâtage à la dose recommandée et respecter les intervalles d'application du produit.

Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation.

Stocker dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière